

LEPAGEA n° 21

Une publication de la Société québécoise de bryologie

BRYOPHYTES DU BOISÉ DE LA POINTE SAINT-GILLES (BAIE-COMEAU, QUÉBEC, CANADA) VERSION DU 8 MAI 2017

Société québécoise de bryologie
[info@societequebecoisedebryologie.org]

La Réserve naturelle du Boisé de la Pointe Saint-Gilles, d'une superficie de 175 hectares, est située dans la ville de Baie-Comeau, MRC Manicouagan, en bordure de l'estuaire maritime du Saint-Laurent, à l'est de l'embouchure de la rivière Manicouagan. Le socle rocheux est formé de roches acides. L'altitude varie de 0 à 87 mètres. Des écosystèmes forestiers, marins et lacustres s'y côtoient. Bien que la sapinière à bouleau blanc domine, on y trouve également des pessières et des peupleraies. La seule section du boisé n'ayant subi aucune perturbation au cours des 80 dernières années est une pinède grise. Le reste du territoire a subi une coupe forestière totale, en 1937, et deux incendies de faible superficie, en 1941 et en 2000. Le boisé appartient à Produits forestiers Résolu, qui est depuis 2008 partenaire du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel..



Situation géographique du territoire étudié

Sources

- 1 – ANONYME, 2005. Liste de plantes du Boisé de la Pointe St-Gilles. <http://www.boisestgilles.ca>. Consulté le 20 avril 2017.
- 2 – HERBIER S. LECLERC, Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec).
- 3 – LECLERC, S., 2016. Observation sur le terrain, sans récolte.
- 4 – SQB, Herbarium de la Société québécoise de bryologie, Saint-Valérien (Québec)

Comment citer ce document

Société québécoise de bryologie, 2017. Bryophytes du Boisé de la Pointe Saint-Gilles (Baie-Comeau, Québec, Canada) – Lepagea n° 21, 3 pages. [Version du 8 mai 2017].

HEPATICAE

- Bazzania tricrenata* (Wahlenb.) Trevis. – 2
Bazzania trilobata (L.) Gray – 1, 3
Blasia pusilla L. – 2
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. var. *trichophyllum* – 2
Calypogeia integristipula Stephani – 2
Diplophyllum apiculatum (A, Evans) Steph. – 2
Frullania bolanderi Austin – 2
Lepidozia reptans (L.) Dumort. – 2
Marchantia polymorpha L. subsp. *ruderalis* Bischl. & Boisselier – 3
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. – 3
Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. & Váňa – 2
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. var. *porelloides* – 2
Ptilidium ciliare (L.) Hampe. – 3
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. – 2
Radula complanata Dumort. – 2
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle – 2
Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. – 2
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle – 2
Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. – 2

MUSCI

- Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. – 2
Andreaea rupestris Hedw. – 2
Atrichum crispulum Schimp. ex Besch. – 2
Atrichum crispum (James) Sull. – 2
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr. – 2
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – 2
Bartramia pomiformis Hedw. – 2
Buxbaumia aphylla Hedw. – 2
Buxbaumia piperi Best – 4
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – 2
Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – 2
Dicranella rufescens (With.) Schimp. – 2
Dicranum scoparium Hedw. – 1
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2
Encalypta ciliata Hedw. – 2
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. – 2
Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M. Fleisch. ex Broth. – 2
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. – 1, 3
Hypnum imponens Hedw. – 2
Hypnum pallescens (Hedw.) P. Beauv. – 2
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångström – 2
Neckera pennata Hedw. – 2
Nyholmiella obtusifolia (Schrad. ex Brid.) Holmen & E. Warncke – 2
Orthotrichum sordidum Sull. & Lesq. – 2
Orthotrichum speciosum Nees – 2
Plagiopus oederianus (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson – 2
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. – 1, 2
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. – 2
Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. – 2

MUSCI

Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. – 2
Polytrichum commune Hedw. var. commune – 1
Polytrichum juniperinum Hedw. – 1
Polytrichum piliferum Hedw. – 2
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – 1, 3
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. subsp. canescens – 2
Racomitrium microcarpum (Hedw.) Brid. – 2
Rhizomnium appalachianum T.J. Kop. – 2
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – 1, 2
Sphagnum magellanicum Brid. – 3
Sphagnum squarrosum Crome – 3
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – 2
Tetraphis geniculata Girg. ex Milde – 2
Tetraphis pellucida Hedw. – 3
Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar – 2
Ulota crispa (Hedw.) Brid. – 2
Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar – 2
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – 2

NOMBRE DE TAXONS RÉPERTORIÉS

Hepaticae – 19

Musci – 47

Total – 66

