


# LEPAGEA n° 8

Une publication de la Société québécoise de bryologie

## BRYOPHYTES DE LA RÉGION DU MONT REED (MRC CANIAPISCAU, QUÉBEC, CANADA) VERSION DU 2 MAI 2016

Société québécoise de bryologie  
[info@societequebecoisedebryologie.org]

Le mont Reed est situé au nord de l'ancienne ville de Gagnon dans la MRC Caniapiscau, à proximité de la route 389 entre les bornes 408 et 412. Dans ce secteur de la forêt boréale typique se trouve une enclave où affleurent un socle rocheux calcaire, marbres de Dudley, supportant une florule basiphile remarquable qui est ici documentée.



Situation géographique du territoire étudié

### Sources

- 1 – FAUBERT, J., S. LECLERC, A. LAVOIE, M. LAPOINTE, S. NADEAU, M. LAMOND et collaborateurs, 2014+. Base de données des bryophytes du Québec-Labrador (BRYOQUEL). En ligne à <http://societequebecoisedebryologie.org>.
- 2 – FAUBERT, J., et M. LAPOINTE, 2010. Observation sur le terrain, sans récolte.

### Comment citer ce document

Société québécoise de bryologie, 2016. Bryophytes de la région du mont Reed (MRC Caniapiscau, Québec, Canada). – Lepagea, n° 8, 3 pages. [Version du 2 mai 2016].

## HEPATICAÆ

- Anthelia julacea* (L.) Dumort. – 1  
*Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dumort. var. *brevirete* Bryhn & Kaal. – 1  
*Jungermannia gracillima* Sm. – 1  
*Jungermannia subelliptica* (Lindb. ex Heeg) Levier – 1  
*Mesoptychia badensis* (Gottsche ex Rabenh.) L. Söderstr. & Váňa – 1  
*Lophozia bicrenata* (Schmidel) Dumort. – 1  
*Moerckia flotoviana* (Nees) Schiffn. – 1  
*Nardia geoscyphus* (De Not.) Lindb. – 1  
*Pellia neesiana* (Gottsche) Limpr. – 1  
*Preissia quadrata* (Scop.) Nees subsp. *hyperborea* R.M. Schust. – 1  
*Scapania mucronata* H. Buch – 1

## MUSCI

- Aongstroemia longipes* (Sommerf.) Bruch & Schimp. – 1  
*Brachythecium rivulare* Schimp. – 1  
*Bryum blindii* Bruch & Schimp. – 1  
*Bryum calobryoides* J.R. Spence – 1  
*Campylophyllum halleri* (Hedw.) M. Fleisch. – 1  
*Catoscopium nigratum* (Hedw.) Brid. – 1  
*Cinclidium subrotundum* Lindb. – 1  
*Dicranella varia* (Hedw.) Schimp. – 1  
*Ditrichum flexicaule* (Schwägr.) Hampe – 1  
*Drepanocladus longifolius* (Wilson ex Mitt.) Broth. ex Paris – 1  
*Encalypta procera* Bruch – 1  
*Fissidens osmundoides* Hedw. – 1  
*Hygrohypnum ochraceum* (Turner ex Wilson) Loeske – 1  
*Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp. – 2  
*Hypnum recurvatum* (Lindb. & Arnell) Kindb. – 1  
*Meesia triquetra* (L. ex Jolycl.) Ångström – 1  
*Meesia uliginosa* Hedw. – 1  
*Mnium spinulosum* Bruch & Schimp. – 1  
*Myurella sibirica* (Müll. Hal.) Reimers – 1  
*Myurella tenerrima* (Brid.) Lindb. – 1  
*Neckera pennata* Hedw. – 1  
*Orthothecium chryseum* (Schwägr.) Schimp. var. *chryseum* – 1  
*Orthothecium intricatum* (Hartm.) Schimp. – 1  
*Orthotrichum anomalum* Hedw. – 1  
*Paludella squarrosa* (Hedw.) Brid. – 1  
*Palustriella falcata* (Brid.) Hedenäs – 1  
*Plagiopus oederianus* (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson – 1  
*Platydictya jungermannioides* (Brid.) H.A. Crum – 1  
*Pleurozium schreberi* (Willd. ex Brid.) Mitt. – 2  
*Pohlia elongata* Hedw. var. *elongata* – 1  
*Ptilium crista-castrensis* (Hedw.) De Not. – 2  
*Schistidium canadense* (Dupret) Ignatova & H.H. Blom – 1  
*Schistidium dupretii* (Thér.) W.A. Weber – 1  
*Schistidium robustum* (Nees & Hornsch.) H.H. Blom – 1  
*Scorpidium cossonii* (Schimp.) Hedenäs – 1  
*Scorpidium revolvens* (Sw.) Rubers – 1  
*Tetraplodon mnioides* (Hedw.) Bruch & Schimp. – 1  
*Tortella tortuosa* (Hedw.) Limpr. – 1

**NOMBRE DE TAXONS RÉPERTORIÉS**

Hepaticae – 11

Musci – 38

Total – 49

